

# مرور سریع بیماری‌های پوست

مدرس:

دکتر احمد غفاری



# آناتومی و نشانه شناسی پوست

کدام ضایعه پوستی در دسته ضایعات ثانویه تقسیم بندی می شود ؟

الف) پاپول اریتماتوس اکنه

ب) پاسچول فولیکولیت سر

ج) ندول اریتم ندوزم

د) اسکار آبله مرغان

کدام گزینه در ارتباط با آناتومی پوست صحیح می باشد ؟

الف) ضخیم ترین درم در کف دست و پا می باشد

ب) ضخیم ترین اپیدرم در ناحیه پشت می باشد

ج) منشا جنینی ملانوسیت از مغز استخوان می باشد

د) کلاژن تشکیل دهنده غشا پایه کلاژن نوع ۴ می باشد

کدام گزینه در ارتباط با غدد عرق نادرست می باشد ؟

- الف) ترشح غدد آپوکرین بدون بو می باشد
- ب) سیستم عصب دهی غدد اکرین و آپوکرین از سمپاتیک می باشد
- ج) غدد آپوکرین مستقیم به سطح پوست باز میشود
- د) گیرنده موسکارینی نقش اصلی را در تحریک غدد اکرین بعهدہ دارند

بیشترین و کمترین درصد فاز رشد موی سر به ترتیب شامل.....  
می باشد.

الف) آناژن - کاتاژن

ب) آناژن - تلوزن

ج) کاتاژن - تلوزن

د) تلوزن - آناژن

کدام گزینه در ارتباط با هیستوپاتولوژی غلط می باشد ؟

الف) پاراکراتوز: باقی ماندن هسته در لایه شاخی

ب) آکانتولیز : جدا شدن کراتینوسیت از یکدیگر

ج) اسپونژیوز: تجمع آب درون سلول کراتینوسیت

د) دیس کراتوز : دیده شدن کراتین در لایه خاردار

آقای ۲۳ ساله با اکنه پاپولر واسکار و میلیا و تلانژکتازی در صورت بدنبال مصرف آنتی بیوتیک دچار کهیر شده کدام ضایعه در این بیمار جز ضایعات تشخیصی می باشد؟

الف) کهیر

ب) پاسچول

ج) میلیا

د) اسکار



در ارتباط با سلول لانگرهانس کدام گزینه غلط می باشد ؟

الف) در سیتوپلاسم سلول لانگرهانس گرانول بیربک وجود دارد

ب) منشا لانگرهانس از neural crest می باشد

ج) لانگرهانس در ارائه آنتی ژن به لنفوسیت نقش دارد

د) مارکر HC لانگرهانس S100 و CD1 می باشد

# خارش

آقای ۶۶ ساله دیابتی با کاهش وزن و زردی و کیسه صفرا قابل لمس بشما مراجعه نموده است در بررسی آزمایشگاهی هیپربیلی روبینمی ( با غلبه نوع بیلی روبین کونژوگه ) گزارش گردیده کدام گزینه در این بیمار غلط می باشد ؟

- الف) بیشترین خارش در پوست شکم می باشد
- ب) نالتروکسان در بهبود خارش این بیمار موثره
- ج) کپسول اورسودی اکسی کولیک اسید در بهبود خارش موثره
- د) بین سایز تومر و شدت خارش ارتباطی وجود ندارد

در کدام گزینه خارش ژنرالیزه شایع نمی باشد ؟

الف) دیابت

ب) هیپرتیروئید

ج) هیپوتیروئید

د) فقر آهن

کدام بیماری با واکنش شدید حساسیتی به نیش حشرات همراه می باشد ؟

الف) لنفوم هوچکین

ب) لنفوم غیر هوچکین

ج) لوسمی CML

د) لوسمی CLL

آقای ۵۴ ساله با تشخیص CKD بدلیل خارش شدید مراجعه نموده  
است کدام گزینه در درمان خارش این بیمار نقش ندارد؟

الف) شارکول

ب) نالتروکسان

ج) همودیالیز

د) گاباپنتین

یک کودک ۸ ساله مبتلا به درماتیت آتوپیک از خارش شدید بدنبال پوشیدن لباس پشمی شکایت دارد . اسم این پدیده چیست ؟

الف) نوتالژیا پارسنتیکا

ب) کوبنر

ج) آلوکینزی

د) نیکولسکی

کدام گزینه در ارتباط با خارش نادرست می باشد ؟

الف) خارش ژنرالیزه در هیپو تیروئیدی شایعتر از هیپر تیروئیدی می باشد

ب) خارش لنفوما هوجکین شایعتر از غیر هوجکین می باشد

ج) خارش کلستازها بیشتر در دست و پا متمرکز می باشد

د) خارش در لنفوما شایعتر از لوسمی می باشد



کھپیر

خانمی با کهیر مزمن به کلینیک پوست مراجعه نموده کدام گزینه با

کهیر بیمار بی ارتباط می باشد ؟

الف) عفونت هلیکوباکتر معده

ب) هیپوتیروئیدی هاشیماتو

ج) دیابت تیپ دو

د) ویتیلیگو

کدام گزینه در درماتوگرافیسم غلط می باشد ؟

الف) شایعترین فرم کهیر فیزیکی می باشد

ب) آلرژی غذایی در آن نقشی ندارد

ج) سابقه آتوپی نقش مهمی در آن دارد

د) بدنبال ابتدا به گال میتونه ایجاد بشه

انتخابی ترین آنتی هیستامین زن حامله جهت کهیر کدام مورد می باشد ؟

الف) داگزپین

ب) کلماستین

ج) کلرفنیرامین

د) ستیریزین

بیماری با تشخیص کهیر از شما در مورد عواملی که کهیر را بدتر می کند سوال میکنه کدام عامل در این فرد کهیر را تشدید نمیکنه ؟

الف) ایندومتاسین

ب) استامینوفن کدئین

ج) پاراستامول

د) آسپرین

بیماری کهیر خود را بشکل ضایعات پاپولر در بالا تنه که همراه دل درد و ویزینگ در ریه می باشد توصیف میکنه .

تشخیص شما کدام کهیر می باشد ؟

الف) درموگرافیسیم

ب) آکواژنیک

ج) کولینرژیک

د) فشاری تاخیری

در افتراق کهیر و آنژیوادم گزینه غلط کدامیک می باشد ؟

الف) کهیر برنگ صورتی و آنژیوادم برنگ پوست می باشد

ب) کهیر زیر ۲۴ ساعت و آنژیوادم ۲ تا ۳ روز طول می کشد

ج) حدود کهیر نا واضح تر از آنژیوادم می باشد

د) کهیر بیشتر با خارش و آنژیوادم بیشتر با درد سوزش همراه می باشد

درمان انتخابی اول در واکنش آنافیلاکسی کدام گزینه می باشد ؟

الف) هیدروکورتیزون وریدی

ب) اسپری سالبوتامول

ج) آمپول کلماستین

د) اپی نفرین عضلانی



خانم جوانی با حملات مکرر تورم پلک و لب بهمراه دل درد و تهوع به شما مراجعه نموده خواهر و مادر وی نیز علائم مشابه دارند کدام دارو در این فرد قدغن می باشد ؟

الف) داناژول

ب) قرص کنتراسپتیو

ج) استاناژول

د) داکسپین

خانمی باردار گراوید ۱ در ۳ ماهه سوم بارداری با ضایعات پاپولر و پلاک کهیری در تنه مراجعه نموده کدام گزینه با تشخیص PUPPP منافات دارد؟

الف) درگیری ناف

ب) عدم عود در حاملگی بعدی

ج) عدم خطر برای مادر و جنین

د) منفی بودن رسوب ایمونوگلوبین در ایمونوفلورسانس پوستی

در بیماری با تشخیص آنژیوادم ارثی اندازه گیری کدام کمپلمان در اسکرین نقش دارد؟

الف) میزان C۴

ب) میزان C۲

ج) میزان C۱

د) سطح C۵

کدام دارو در درمان کهیر نقشى ندارد ؟

الف) پردنیزولون خوراکی

ب) قرص رانیتیدین

ج) کرم کلوبتازول

د) قرص فکسوفنادین

کدام عامل در کهیر حاد شایعتر می باشد ؟

الف) عفونت ویروسی

ب) علل دارویی

ج) علل تغذیه ای

د) اتوایمنی

در بررسی کهیر مزمن کدام گزینه اندیکاسیون ندارد ؟

الف) TSH

ب) FBS

ج) H. pylori Ab

د) گرافی سینوس

# پسوریازیس

در بیمار مبتلا به پسوریازیس با توجه به مشکل قلبی کدام دارو را  
انتخاب نمی کنید؟

الف) آملودیپین

ب) متورال

ج) فورسماید

د) والسارتان



کدام دارو در پسوریازیس نبایستی تجویز بشود؟

الف) کپسول سیکلوسپورین

ب) استروئید سیستمیک

ج) متوتروکسات

د) آسیترتین

در مصرف آسیترتین پیش گیری از بارداری تا چه مدت در خانمها الزامی

می باشد ؟

الف) ۱ ماه

ب) ۱ سال

ج) ۳ سال

د) ۶ ماه

درگیری چند درصد بدن در پسوریازیس اندیکاسیون درمان سیستمیک می باشد ؟

الف) ۵%

ب) ۱۰%

ج) ۱۵%

د) ۲۰%

در بیماری پسوریازیس کدام گزینه دیده نمی شود ؟

الف) علامت کوبنر

ب) پدیده آسپیتز

ج) علامت نیکولسکی

د) میکرو آبسه مونرو

در پاتولوژی پسوریازیس کدام گزینه دیده نمی شود ؟

الف) کاهش لایه گرانولر

ب) پاراکراتوز

ج) افزایش پیچ پیچ شدن عروق درم

د) سلول آتیپیک لایه بازال

در بیماری پسوریازیس همه گزینه ها صحیح هستند بجز؟

- الف) پسوریازیس در منطقه فلکسور دیده نمی شود
- ب) شایعترین فرم آرتрит پسوریازیس الیگو آرتريت می باشد
- ج) زبان جغرافیایی در پسوریازیس دیده می شود
- د) لیتیم سبب تشدید پسوریازیس می گردد

در بیمار مبتلا به پسوریازیس کدام گزینه دیده نمی شود ؟

الف) وقوع oil drop در ناخن

ب) کاهش ریسک عفونت باکتریال پوست

ج) وقوع فرم شدیدتر پسوریازیس در HIV

د) خطوط ویکهام در سطح ضایعه

اگزما



در خانم جوانی با ضایعه خارش دار اریتماتوس دست که با ترشح همراه هست کدام گزینه بکار می رود؟

الف) پماد تاکرولیموس ۰.۱٪

ب) پماد کلوبتازول

ج) محلول بارو

د) قرص فکسوفنادین

در آزمایش مزمن کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

- الف) لیکنیفیکاسیون در معاینه پوست دیده می شود
- ب) لوسیون ویا کرم استروئیدی اساس درمان می باشد
- ج) پماد تاکریل در درمان آن سودمند می باشد
- د) تزریق تریامسینولون داخل ضایعه در درمان آن مفید می باشد

کدام دارو خاصیت خشک کننده برای ترشحات اگزمایی ندارد ؟

الف) آب دالیبور

ب) محلول بارو

ج) محلول پرمنگنات

د) محلول کلیگمن

# درماتیت آتوپیک

کودکی با سابقه خانوادگی آسم بدلیل خشکی و ضایعات خارش دار در حفره کوبیتال ۲ طرفه که عود کننده می باشد به شما ارجاع گردیده است کدام گزینه معیار ماژور تشخیص درماتیت آتوپیک نیست ؟

الف) خشکی پوست

ب) خارش

ج) ضایعات عود کننده

د) سابقه خانوادگی آسم

کدام تظاهر پوستی در فرد با درماتیت آتوپیک شایعتر نمی باشد ؟

- الف) تیرگی دور چشم
- ب) درموگرافیسیم سفید
- ج) درماتوگرافیسیم فوری
- د) ابتلا به اگزما هرپتیکوم

کودکی ۶ ماهه با تشخیص درماتیت آتوپیک پیش شما آورده شده  
جمله درست کدام گزینه می باشد ؟

الف) آغاز بیماری از هفته ۲ تولد می باشد

ب) صورت و مناطق فلکسور محل اصلی درگیری در این سن هستند

ج) هیستامین مدیاتور اصلی خارش در این بیماری می باشد

د) در نواحی اندمیک بیماریهای کرم و انگلی شیوع درماتیت آتوپیک  
کمتر می باشد

کدام گزینه تشخیص درماتیت آتوپیک را زیر سوال میبرد؟

- الف) درگیری ناحیه پوشک شیرخوار ۸ ماهه
- ب) افزایش خطوط کف دست کودک ۱۰ ساله
- ج) کاتاراکت ساب کپسولار مرد ۲۰ ساله
- د) اگزمای پلک ۲ طرفه کودک ۱۰ ساله



# درماتیت سبوریه یک

در آقای مبتلا به درماتیت سبوره یک درگیری کدام محل شایع  
نمی باشد ؟

الف) جلوی استرنوم

ب) چین کشاله ران

ج) چین زیر بغل

د) حفره کوبیتال

آقای HIV+ که با شوره شدید مقاوم مراجعه نموده و تحت درمان مزمن هالوپریدول والسارتان و هیدروکلروتیازید و آلپورینول قرار دارد کدام گزینه شوره شدید و مقاوم را توجیه می نماید؟

الف) هیدروکلروتیازید

ب) هالوپریدول

ج) والسارتان

د) آلپورینول

شیرخواری ۶ هفته با حال عمومی خوب و بیچ و پلاک قرمز سرو صورت و ناحیه پوشک پیش شما آورده شده تشخیص چیست ؟

الف) درماتیت آتوپیک

ب) درماتیت آستئاتوتیک

ج) درماتیت سبوریه یک

د) درماتیت دیس هیدروتیک

آقای ۲۵ ساله با پوسته ریزی ابرو و ریش به همراه شوره سر به درمانگاه پوست مراجعه نموده است کدام گزینه در این فرد صحیح می باشد ؟

- الف) تراشیدن ریش سبب بهبود ضایعات پوستی صورت میشود
- ب) پردنیزولون خوراکی درمان مناسب بیمار می باشد
- ج) قرص تربینافین در بهبود ضایعات کمک کننده می باشد
- د) کرم کلوبتازول برای التهاب صورت و ابرو انتخاب مناسبی می باشد

# درماتیت تماسی

آقایی با سابقه چندین ساله درماتیت در محل بستن کمربند از جنس نیکل مراجعه نموده با توجه به تشخیص بالینی کدام گزینه غلط می باشد؟

- الف) تست پیچ به تشخیص عامل کمک می کند
- ب) واکنش پوستی بیمار تیپ ۴ حساسیتی می باشد
- ج) درد و سوزش علامت اصلی این بیمار می باشد
- د) به طلای سفید هم حساسیت دارد

نوجوانی با سابقه درماتیت آتوپیک با ضایعات وزیکولر خارش دار  
راجعه کف دست و انگشتان مراجعه نموده است تشخیص بیماری  
چیست؟

الف) دیس هیدروتیک اگزما

ب) پسوریازیس پاسچولر

ج) واکنش داروئی

د) درماتیت هرپتی فرم



تمام گزینه های زیر در درماتیت تماسی تحریکی صحیح می باشد بجز؟

الف) در زنان شایعتر می باشد

ب) دست شایعترین محل این درماتیت می باشد

ج) تست پچ کاربردی در این درماتیت ندارد

د) ضایعات وزیکولر در درماتیت تماسی تحریکی شایعتر می باشد

در فردی که باپماد حاوی نئومایسین دچار درماتیت تماسی گردیده  
کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) سطح IgE سرم بالا می باشد

ب) بلافاصله بعد تماس با پماد درماتیت ظاهر میشود

ج) شایعترین عامل درماتیت آلرژیک تماسی در دنیا نئومایسین  
می باشد

د) خارش و وزیکول در درماتیت تماسی آلرژیک شایعتر از درماتیت  
تحریکی می باشد

# لیکن پلان

کدام گزینه اندیکاسیون مصرف استروئید سیستمیک در فرد لیکن پلانی را ندارد؟

الف) لیکن پلانوپیلاریس

ب) لیکن پلان ناخن

ج) لیکن پلان اروزیو دهانی

د) لیکن پلان هیپرتروفیک

آقای با تشخیص لیکن پلان بیوپسی گردیده است کدام مورد در پاتولوژی این فرد دیده نمی شود ؟

الف) افزایش ضخامت لایه گرانولر  
ب) اجسام Civot در لایه بازال  
ج) انفیلتراسیون باندی لنفوسیت CD۸  
د) میکرو آبهه مونرو

آقای شاغل در عکاسی با سابقه هپاتیت C و تحت درمان کلروکین  
واسپری سالمترول و فلوتیکازون جهت آسم می باشد بدلیل ضایعات  
پاپولر خارش دار بنفش ساعد مراجعه نموده  
کدام عامل ریسک فاکتور بیماری پوستی در این فرد نمی باشد ؟

الف) شغل فرد

ب) کلروکین

ج) هپاتیت C

د) سالمترول

خانمی بدلیل تشکیل تاول که فقط روی ضایعات لیکن پلان محدود می باشد به درمانگاه پوست مراجعه نموده است تشخیص شما چیست ؟

الف) لیکن پلان پمفیگویی

ب) لیکن پلان بولوس

ج) لیکن پلان هیپرتروفیک

د) پمفیگوس فولیاسه

کدام فرم لیکن پلان ریسک بدخیمی بیشتری دارد؟

الف) فرم رتیکولر شدید دهانی

ب) فرم آنولر اگزایلا

ج) فرم لیکن پلانوپیلاریس

د) فرم اروزیو دهانی



قارچ

در کدام گزینه زیر اندیکاسیون داروی خوراکی برای عفونت درماتوفیتی

۵۵

نمی باشد ؟

tinea capitis (الف)

(ب) انیکومایکوز دست

tinea manus (ج)

tinea cruris (د)

خانمی با تشخیص tinea cruris به شما مراجعه نموده کدام گزینه مخزن عفونت این بیماری نمی باشد ؟

الف) خاک باغچه

ب) گربه خانگی

ج) همسر بیمار

د) آب آلوده چاه

در معاینه اسکالپ یک پسر ۱۰ ساله کشتی گیر یک پچ کم مو بشکل نقاط سیاهرنگ که بدلیل موهای شکسته می باشند دیده میشود کدام گزینه در این بیمار نادرست می باشد ؟

الف) تشخیص درمافیت بشکل اندوتریکس مطرح می باشد

ب) فلورسانس منفی می باشد

ج) حتما بایستی درمان سیستمیک شروع بشود

د) شایعترین عامل مطرح اپیدرموفیتون می باشد

طولانی ترین مدت درمان سیستمیک در عفونت کدام محل درماتوفیت

بکار می رود ؟

الف) سر

ب) ناخن پا

ج) تنه

د) کشاله ران

کدام گزینه افتراق دهنده عفونت درماتوفیتی کشاله ران از عفونت

کاندیدایی می باشد ؟

الف) قرمزی پوست

ب) خارش و سوزش

ج) درگیری پوست بیضه

د) پاسخ درمانی به آزول موضعی

شایعترین فرم عفونت درماتوفیتی کدام گزینه می باشد؟

الف) ناخن پا

ب) پا

ج) موی سر

د) کشاله ران

کودکی با ریزش مو بشکل پچ پوسته دار در سر مراجعه نموده در بررسی میکروسکوپی میسلیوم و حباب هوا در درون ساقه مو دیده میشود تشخیص چیست؟

الف) اندوتریکس

ب) اکتوتریکس

ج) فاووس

د) کریون



نمای spaghetti & meat ball در زیر میکروسکوپ در کدام عفونت

قارچی دیده میشود؟

الف) درماتوفیت تنه

ب) تینئا ورسیکالر

ج) کاندیداز دهان

د) آسپارژیلوس

کدام گزینه در درمان تینئا ورسیکالر کاربردی ندارد؟

الف) قرص تربینافین

ب) کرم تربینافین

ج) کپسول فلوکونازول

د) کرم سرتاکونازول

جوانی دامپرور بدلیل عفونت درماتوفیت پشت پا مراجعه نموده است

تشخیص شما چیست؟

tinea corporis (الف)

tinea pedis (ب)

tinea imbericata (ج)

tinea mannis (د)

در خانمی که بدلیل اریتم و سوزش در زیر پستان ها با ضایعات پاستولر اطراف آن مراجعه نموده است کدام دارو موثر می باشد؟

الف) اریترومايسين موضعی

ب) قرص گریزوفلوین

ج) کپسول ایتراکونازول

د) کپسول آزیترومایسین

در ارتباط با لامپ وود کدام جمله صحیح می باشد ؟

الف) رنگ زرد طلایی در اریتراسما

ب) رنگ قرمز مرجانی در تینئا ورسیکالر

ج) رنگ فلورسانس سبز در کچلی سر فاووس

د) فلورسانس سبز و آبی در کچلی اندوتریکس مو

کدام فرم کاندید از مخاطبی در مردان سیگاری دیده میشود؟

الف) آتروفیک گلوسیت حاد

ب) هیپرپلاستیک

ج) کیلیت انگولار

د) برفک

# بیماری های ویروسی

آقای ۲۵ ساله که در طبخ‌خانه کار می‌کند با ضایعه تاولی در وسط یک ندول قرمز در دست چپ مراجعه نموده با توجه به تشخیص بیماری کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

- الف) بیماری فرد به بقیه مسری می‌باشد
- ب) کرایو تراپی درمان مناسب اول بیمار می‌باشد
- ج) عامل بیماری کوکساکسی می‌باشد
- د) بیماری خودبخود و بدون اسکار خوب میشود



در کدام گزینه زیر اندیکاسیونی برای شروع آسیکلوویر خوراکی وجود ندارد؟

الف) آبله مرغان زن حامله

ب) آبله مرغان در مرد ۳۰ ساله

ج) زونا در زن باردار

د) زونا در مرد ۶۰ ساله

در بیماری تب خال کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف) عارضه تب خال لب منتزیت آسپتیک می باشد

ب) در غیاب ضایعه هرپس پوست تناسلی هرپس بیماری مسری نمی باشد

ج) عارضه تب خال تناسلی آنسفالیت می باشد

د) عود HSV۱ در ناحیه تناسلی کمتر از HSV۲ در این ناحیه می باشد

یک کودک مبتلا به لوسمی که ۲ روز قبل بدلیل تماس با خواهرش که مبتلا به واریسلا می باشد و به شما مراجعه نموده است . با توجه به عدم ایمنی قبلی کودک توصیه شما چیست ؟

الف) شروع آسیکلویر وریدی

ب) شروع VZIG

ج) واکسیناسیون + شروع VZIG

د) شروع آسیکلویر خوراکی

در بیماری مولوسکوم کونتاژیوزوم جمله غلط کدام گزینه می باشد؟

الف) در افراد درماتیت آتوپیک شایعتر می باشد

ب) در کف دست و پا دیده نمیشود

ج) عامل آن از دسته انتروویروس ها می باشد

د) بیماری خود محدود شونده می باشد

چه مدت پس از زونا چنانچه درد باقی بماند تشخیص  
post herpetic neuralgia مطرح می باشد ؟

الف) ۳۰ روز

ب) ۲ هفته

ج) ۳ ماه

د) ۱ هفته

آقای با ضایعات درد ناک وزیکولر نوک بینی و کنار بینی ۱ طرفه  
(در سمت چپ) مراجعه نموده کدام گزینه در این بیمار صحیح  
نمی باشد؟

الف) آسیکلویر خوراکی شروع می کنیم

ب) با تشخیص سندرم رمزی هانت مشاوره ENT می دهیم

ج) مشاوره چشم پزشکی

د) عصب افتالمیک درگیر می باشد

خانم جوانی ۷ روز بعد ازدواج دچار تب و بی حالی و ضایعات وزیکولر دردناک تناسلی به همراه لنفادنوپاتی دردناک شده است کدام تشخیص محتمل تر می باشد؟

الف) شانکر سیفلیس

ب) هرپس سیمپلکس

ج) لنفوگرانولوم ونروم

د) گرانولوم اینگوینال

کودکی ۳ ساله با سابقه اگزما تکرار شونده در نواحی فلکسور و گردن  
بدلیل تب و ضایعات وزیکولر ناف دار منتشر صورت از دیروز مراجعه  
نموده است کدام عامل عفونی علت این حالت می باشد؟

الف) استاف طلائی

ب) واریسلا

ج) مولوسکوم

د) هرپس سیمپلکس



کودکی ۴ ساله با سابقه اگزمای آتوپیک بدنبال عود تب خال لب دچار ضایعات وزیکولر منتشر صورت و تب و لنفادنوپاتی شده است درمان انتخابی شما کدام گزینه می باشد ؟

الف) وانکومايسين وریدی

ب) پردنیزولون

ج) VZIG

د) آسیکلویر وریدی

برای پسر ۱۲ ساله ای مبتلا به HIV که می خواهد واکسن زگیل بزنه چند دوز لازم می باشد ؟

الف) ۳ دوز

ب) ۲ دوز

ج) ۱ دوز

د) در این بیمار تزریق واکسن قدغن می باشد

The background features a light beige color with large, soft-edged, abstract shapes in a slightly darker beige. There are several circular icons in a teal color. One icon in the top left shows three dots inside a circle. A larger version of this icon is in the center, with the text 'BCC' overlaid in a brown font. Another similar icon is partially visible at the bottom left. A thin white line curves across the right side of the image, and a small white circle is located in the bottom right corner.

**BCC**

آقای ۶۵ ساله با ندول اولسره پیگمانته در بینی مراجعه نموده و در پاتولوژی ضایعه پوستی جزایر سلولی بازوفیلیک با نمای نرده بانی (palisading) در حاشیه جزایر دیده میشود تشخیص چیست؟

الف) SCC

ب) bcc

ج) ملانوما

د) اکتینیک کراتوز

کدام بیمار با تشخیص bcc اندیکاسیون قطعی برای جراحی  
mohs surgery نمی باشد ؟

الف) عود تومر

ب) فرم اسکروزینگ bcc

ج) حاشیه نا واضح bcc

د) نوع سطحی bcc

بروز BCC در کدام محل ناشایع می باشد؟

الف) بینی

ب) گونه

ج) لب بالا

د) پشت دست

# عفونت باکتریال

کودکی با تشخیص زرد زخم تاولی به کلینیک پوست آورده شده جمله غلط در ارتباط با این بیمار کدام گزینه می باشد ؟

الف) لنفادنوپاتی ناشایع می باشد

ب) خطر گلومرونفریت PSGN وجود ندارد

ج) تیتر ASO بالا نیست

د) مدت درمان سیستمیک ۵ روز می باشد



کودکی ۳ ساله که بدنبال زرد زخم هفته قبل دچار اریتم و تاول های سطحی و کراسته منتشر در کل پوست بدن شده کدام گزینه نادرست می باشد؟

- الف) پوست کودک تندر نس دارد
- ب) علامت نیکولسکی در پوست مثبت می باشد
- ج) مخاط دهان درگیر نمی باشد
- د) تاول در محل اتصال درم و اپیدرم دیده میشود

در مقایسه سلولیت و بادسرخ (اریزوپل) کدام گزینه بنفع بادسرخ می باشد؟

الف) حدود نا واضح ضایعات پوستی

ب) علائم سیستمیک بیشتر

ج) عفونت باکتریال استاف طلائی

د) اریتم کمتر

یک مرد مبتلا به AML با تب و نوتروپنی بستری شده و در روز اول دچار تاول های هموراژیک که پاره گردیده و کراسته شده و با کاهش هوشیاری و افت فشار خون همراه شده است  
عامل عفونی این حالت کدام گزینه می باشد؟

الف) مننگوکوک

ب) استاف طلایی

ج) پسودموناس

د) پاستورلا

آقای مبتلا به هموکروماتوز بدنبال سفر به تایلند و مصرف غذای خام دریایی دچار سپسیس و تاول های هموراژیک شده است عامل عفونی مطرح کدام گزینه می باشد ؟

الف) ویبریو پارهمولیتیکوس

ب) ویبریو ولنفیکوس

ج) هموفیلوس انفلوانزا

د) شیگلا فلکسنری

آقای با ضایعه پلاک اریتماتوس تندر در صورت با حدود نامشخص با  
تب لرز از روز قبل مراجعه نموده است  
تشخیص شما کدام گزینه می باشد؟

الف) اریتراسما

ب) سلولیت

ج) باد سرخ

د) اکتیما گانگروزوم

آقای با ندول دردناک اریتماتوس در باسن از ۳ روز قبل مراجعه نموده  
از روز قبل بدنبال کمپرس گرم دچار ترشح چرکین شده است  
اقدام بعدی شما چیست ؟

الف) شروع سفالکسین

ب) شروع فلوکونازول

ج) پنی سیلین تزریقی

د) اقدامی لازم نیست

فرونکل و کاربونکل عفونت کدام قسمت پوست می باشد ؟

الف) غدد چربی

ب) غدد اکرین

ج) غدد آپوکرین

د) فولیکول مو

کودک ۶ ساله مبتلا به زرد زخم در ریسک کدام عارضه می باشد ؟

الف) تب روماتیسمی

ب) گلومرونفریت

ج) اندوکاردیت استرپتوکوکی

د) همه موارد فوق



کدام عامل ریسک فاکتور اریتراسما نمی باشد؟

الف) سن بالا

ب) چاقی

ج) جنسیت

د) دیابت

شایعترین محل اریتراسما کدام گزینه می باشد؟

الف) لای انگشتان پا

ب) کشاله ران

ج) زیر سینه

د) زیر بغل

در عفونت زرد زخم که استاف MRSA گزارش شده است کدام دارو موثر  
نمی باشد؟

الف) داکسی سیکلین

ب) کوتری موکسازول

ج) کواموکسی کلاو

د) کلیندامایسین

ملانو ما

همه عبارات زیر در مورد ملانوما صحیح هستند بجز :

الف) شایعترین ملانوما در ایران نوع اکرال می باشد

ب) ملانوما در سفیدان شایعتر از سیاهان می باشد

ج) برای بیوپسی ملانوما روش shave استفاده نمی شود

د) شایعترین ملانوما در جهان نوع لنتیگو مالیگنا می باشد

آقای ۸۰ ساله با ضایعه ملانومای ساعد با درگیری غدد لنفی به شما  
مراجعه نموده است کدام گزینه پروگنوز بدتر نمی کند ؟

الف) سن

ب) جنس

ج) محل تومر

د) درگیری غدد لنفی

خانمی ۴۵ ساله با ضایعه پیگمانته غیر قرینه به قطر ۲ سانت و حاشیه غیر منظم و تنوع رنگ در بخش های مختلف به کلینیک پوست مراجعه نموده است بهترین روش بیوپسی چیست ؟

الف) انسزیون

ب) اکسزیون

ج) پانچ

د) shave biopsy

در گزارش پاتولوژی یک مرد با تشخیص ملانوما عمق تومر در درم رتیکولار گزارش شده است . کلارک بیمار تعیین کنید ؟

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۳

د) ۴



# واکنش داروئی

خانمی با تب و بی حالی و ضایعات پاسچولر منتشر در تنه مراجعه  
نموده است . بیمار از ۴ روز پیش آموکسی سیلین مصرف می کند  
تشخیص شما چیست ؟

الف) fix drug reaction

ب) پسوریازیس پاسچولر ژنرالیزه ( GPP )

ج) واکنش اگزانتوماتوس منتشر پاسچولر ( AGEP )

د) بیماری سرم

خانمی ۵۶ ساله با فنی توئین دچار سندرم استیون جانسون شده کدام دارو برای کنترل تشنج بیمار قابل مصرف می باشد ؟

الف) کاربامازپین

ب) فنوباریتال

ج) سدیم والپورات

د) همه موارد فوق قابل مصرف می باشند

خانمی تحت درمان وارفارین و متورال و فورسماید و فنی توئین می باشد بیمار بعد از چندین ماه از شروع درمان از ریزش مو شکایت داره کدام دارو مقصر نمی باشد ؟

الف) متورال

ب) وارفارین

ج) فورسماید

د) فنی توئین

ضایعات شبه اکنه ای در مصرف کدام دارو شایع نمی باشد ؟

الف) لیتیم

ب) ایزونیازید

ج) فنی توئین

د) ریفامپین

کدام گزینه در واکنش های داروئی صحیح می باشد ؟

الف) در مردان شایعتر است

ب) در نوجوانان شایعتر است

ج) در افراد HIV شایعتر است

د) گزینه الف و ب

# ٲاٲولٲ

در کدام بیماری تاولی مصرف بتادین سبب تشدید بیماری میشود؟

الف) پمفیگوس ولگاریس

ب) پمفیگوس فولیاسه

ج) درماتیت هرپتی فرم

د) بولوس پمفیگوئید



آقای ۶۷ ساله با ضایعات اگزمایی در تنه از ۲ ماه قبل مراجعه نموده است و از ۱ هفته قبل دچار ضایعات تاولی زیر بغل و تنه شده جمله نادرست در ارتباط با این فرد کدام گزینه می باشد ؟

(الف) محل تاول ساب اپیدرمال می باشد

(ب) در ایمونوفلورسانس رسوب IgA گرانولر دیده میشود

(ج) انفیلتراسیون ائوزینوفیلی در بافت دیده میشود

(د) بین تیتر آنتی بادی و شدت بیماری ارتباطی وجود ندارد

تست طلایی تشخیص درماتیت هرپتی فرم کدام گزینه می باشد ؟

الف) پاتولوژی

ب) ایمونوفلورسانس پوستی

ج) پاسخ به داپسون

د) پاسخ به رژیم فاقد گلوتن

آقای با ضایعات تاولی در پوست و زخم دهان مراجعه نموده است در بررسی ایمونوفلورسانس پوستی الگوی تور ماهیگیری (fish net) در اپیدرم دیده میشود تشخیص شما چیست؟

الف) پمفیگوس فولیاسه

ب) پمفیگوس ولگاریس

ج) درماتیت هرپتی فرم

د) بولوس پمفیگوئید

خانمی با تشخیص سلپاک و درماتیت هرپتی فرم مراجعه نموده است

کدام گزینه در این بیمار غلط می باشد ؟

الف) داپسون درمان خوب هر ۲ بیماری می باشد

ب) خطر لنفوما T cell در روده وجود دارد

ج) رسوب گرانولار IgA در پوست دیده میشود

د) غذای دریایی سبب تشدید علائم پوستی میشود

در کدام بیماری آنتی بادی فقط علیه دسموگلین ۱ وجود دارد؟

الف) درماتیت هرپتی فرم

ب) بولوز پمفیگویی

ج) پمفیگوس فولیاسه

د) پمفیگوس ولگاریس

کدام عارضه مربوط به دایسون نمی باشد ؟

الف) هیپاتیت

ب) نروپاتی اغلب حسی

ج) اگرانولوسیتوز

د) متهموگلوبینمی

در گزارش پاتولوژی ضایعه تاولی یک بیمار تاول ساب اپیدرمال به همراه انفیلتراسیون ائوزینوفیل و رسوب خطی IgG در مرز اپیدرم و درم در ایمونوفلورسانس دیده میشود  
تشخیص بیماری کدام گزینه می باشد؟

الف) پمفیگوس ولگاریس

ب) پمفیگوس فولیاسه

ج) بولوز پمفیگویی

د) درماتیت هرپتی فرم

در بیمار درماتیت هرپتی فرم مصرف کدام ماده بلا مانع می باشد ؟

الف) نان گندم

ب) نان جو

ج) برنج

د) همه موارد فوق قدغن می باشند



خانمی باردار گراوید ۱ در ماه ۸ با ضایعات تاولی در تنه و ناف به شما مراجعه نموده است در بررسی پاتولوژی تاول ساب اپیدرمال دیده میشود جمله صحیح با توجه به تشخیص شما کدام گزینه می باشد؟

الف) در حاملگی بعدی عود نمیکند

ب) در حاملگی بعدی شدیدتر عود میکند

ج) هیچ خطری متوجه جنین نمی باشد

د) اغلب بعد زایمان تاول ها ادامه پیدا می کنند

# پیتریازیس روزہ

در بیماری پیتریازیس روزه عبارت صحیح کدام گزینه می باشد ؟

الف) بیماری در سنین دهه ۴ و ۵ شایعتر می باشد

ب) اریترومایسین خوراکی بمدت ۱۴ روز در درمان بیماری بکار می رود

ج) درگیری ناخن در روزه بشکل pitting دیده می شود

د) درگیری صورت شایعترین محل درگیری هست

کدام ترم در توصیف بیماری پیتریازیس روزه بکار نمی رود؟

الف) نمای درخت کریسمس

ب) پوسته collaret

ج) علامت آسپیتز

د) هرالد پچ

# ضایعات عروقی

آقای ۷۹ ساله با پیچ و پلاک قرمز رنگ در کف پای چپ مراجعه نموده و بیوپسی پوست بصورت زیر توصیه شده است :

سلول دوکی و ضایعات عروقی (slit) عامل بیماری فوق کدام گزینه

می باشد ؟

الف) HHV۸

ب) HHV۶

ج) HPV۱۶

د) HSV۲

شیر خواری ۲ ماهه ای توسط مادرش پیش شما آورده شده مادر شیر خوار اظهار میکند ضایعه ندولر قرمز رنگ عروقی لب از هفته ۲ تولد تا به حال بزرگتر شده است کدام گزینه در این بیمار غلط می باشد؟

الف) پروپرانالول درمان انتخابی بیمار می باشد

ب) حتی بدون درمان این توده طی سالها خوب میشود

ج) تزریق استروئید داخل ضایعه در درمان ضایعه پوستی سودمند

می باشد

د) بررسی سندرم استروج و بر بایستی صورت بگیرد

خانمی باردار بدنبال بریده شدن پوست طی پاک کردن گوشت دچار ضایعه پاپولر قرمز خونریزی دهنده از ۲ هفته قبل شده است کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح می باشد؟

(الف) عامل عفونی باکتریال سبب این حالت میشود

(ب) در پاتولوژی گرانولوما کازنئوس دیده میشود

(ج) اریترومایسین خوراکی بمدت ۱۴ روز درمان این بیمار می باشد

(د) کرایو تراپی درمان مناسب این بیمار می باشد



کودکی با تشنج و گلوکوما به جهت ضایعه قرمز ۱ طرفه پیشانی چپ با شما مشاوره میشود جمله غلط در این بیمار کدام گزینه می باشد ؟

الف) با افزایش سن بتدریج ضایعه پوستی خوب میشود

ب) ضایعه پوستی یک مالفورماسیون مویرگی می باشد

ج) ضایعه پوستی از بدو تولد تا آخر عمر باقی می ماند

د) لیزر PDL درمان مناسب ضایعه پوستی می باشد

خال

آقای ۲۰ ساله با پچ پیگمانته بزرگ از سال پیش در روی سینه چپ که با هیپرتریکوز و هیپوپلازی پستان همراه بوده به کلینیک پوست مراجعه نموده است تشخیص شما چیست؟

الف) خال ota

ب) خال ito

ج) خال بکر

د) خال اسپیلوس

بهترین سن جراحی خال مادرزادی بزرگ چه سنی می باشد ؟

الف) بعد بلوغ

ب) ۳ تا ۶ ماهگی

ج) ۶ ماهگی تا ۲ سالگی

د) نیازی به جراحی نمی باشد

خانمی ۲۳ ساله با تیرگی دور چشم راست به‌مراه اسکلرای آبی رنگ به شما مراجعه نموده است تشخیص شما چیست؟

الف) خال بکر

ب) خال اسپیلوس

ج) خال ota

د) لکه شیر قهوه

# ويتيلیگو

ویتیلیگو در کدام بخش بدن پاسخ کمتری به درمان می دهد ؟

الف) سر و صورت

ب) تنه

ج) گردن

د) دیستال اندام

خانمی با سابقه آدیسون مبتلا به ویتیلیگو با درگیری ۸۵٪ سطح بدن  
به جهت درمان مراجعه نموده توصیه درمانی شما چیست؟

الف) کرم مونوبنزن ۲۰٪

ب) نور درمانی با uvb

ج) استروئید موضعی

د) پماد تاکرولیموس



کدام لیزر در درمان ویتیلیگو مفید می باشد؟

الف) لیزر اگزایمر

ب) لیزر PDL

ج) لیزر کیو سواپیچ

د) لیزر CO<sub>2</sub>

# شپش و گال

کدام نوع شپش به مژه حمله می نماید؟

الف) شپش سر

ب) شپش تنه

ج) شپش عانه

د) همه موارد فوق

کدام بیماری باکتریال توسط شپش به انسان منتقل نمی شود ؟

الف) تب خندق

ب) آنژیو باسیلاری

ج) تب راجعه

د) تیفوس اندمیک

کدام دارو در درمان شپش سر کاربردی ندارد ؟

الف) قرص کوتریموکسازول

ب) لوسیون دایمتیکون

ج) قرص ایورمکتین

د) شامپو زینک پیریتیون

لکه ماکول caerulea در کدام نوع شپش دیده میشه ؟

الف) تنه

ب) عانه

ج) سر

د) هیچکدام

خانمی باردار با تشخیص گال با شما مشاوره میشود درمان انتخابی شما چیست؟

الف) قرص ایورمکتین

ب) لوسیون لیندان

ج) کرم کروتامیتون

د) کرم پرمترین ۵٪

برای پیشگیری و درمان گال کدام عبارت صحیح نمی باشد ؟

الف) درمان حیوان خانگی بیمار لازم نیست

ب) نگهداری لباس و ملحفه بمدت ۱۰ روز در پلاستیک

ج) درمان تمام افراد خانواده لازم می باشد

د) درمان موضعی از صورت به پایین



# سالک (لېشمانیوز)

تمام گزینه ها در مورد سالک صحیح هستند بجز :

- الف) کمون سالک شهری طولانی تر از سالک روستایی می باشد
- ب) مدت درمان سالک شهری طولانی از سالک روستایی می باشد
- ج) انگل لیشمانیاز در پشه بشکل آماستیگوتی می باشد
- د) بهترین درمان سالک در زن حامله کرایوتراپی می باشد

آقایی با سالک پوستی مراجعه نموده است در کدام گزینه درمان

سیستمیک الزامی نیست؟

الف) فرم اسپوروتریکوئیدی

ب) سایز بالای ۳ سانتی متر

ج) فرم لوپوئید

د) درگیری بینی

مخزن کدام نوع لishمن انسان می باشد ؟

۱۳۳

L tropica (الف)

L major (ب)

L infantum (ج)

L aethopica (د)

آقای ۱۸ ساله با ظهور جدید ضایعات پاپولر اطراف اسکار سالک قدیمی  
به شما مراجعه نموده است تشخیص شما چیست ؟

الف) اسپروتريکوييد

ب) لويوئيدي

ج) SCC

د) لويوس ولگارييس

# روزاسه اکنه

در پاتوژنز روزاسه کدام گزینه دخیل می باشد ؟

الف) مالاسزیا

ب) باکتری p acne

ج) دمودکس

د) استاف اپیدرمیدیس

تمام گزینه ها در بیماری روزاسه صحیح هستند بجز ؟

الف) بین شدت درگیری پوستی و چشمی در روزاسه ارتباطی وجود ندارد

ب) دمودکس در پاتوژنز روزاسه دخالت دارد

ج) کپسول ایزوترتینوئین در روزاسه کاربرد ندارد

د) اجتناب از چای داغ و الکل به افراد روزاسه توصیه میشود



در پاتوژنز اکنه کدام گزینه دخالت ندارد ؟

الف) افزایش فعالیت غدد چربی تحت اثر سمپاتیک

ب) انسداد منافذ پیلوسباسه

ج) باکتری *P. acne*

د) التهاب

خانمی ۳۴ ساله با اکنه چانه که در ایام عادت ماهانه تشدید میشود به کلینیک مراجعه نموده است کدام گزینه در این بیمار صحیح نیست؟

الف) بررسی pCO

ب) در صورت مصرف اکوتان بایستی تا ۱ سال بعد قطع دارو باردار نشود

ج) درمان ترکیبی در اکنه بهتر از تک دارویی می باشد

د) قطع مکمل های حاوی ویتامین ب

عامل اکنه نوزادی کدام گزینه می باشد ؟

الف) مالاسزیا

ب) استاف ارئوس

ج) استاف اپیدرمیدیس

د) استرپت گروه B

آقای ۱۴ ساله با اکنه ندولوکیستیک با تب و لرز و هیپاتواسپلینومگالی و آرترالژی بستری شده است تشخیص شما کدام گزینه می باشد ؟

الف) اکنه فولمینانت

ب) اکنه کانگلوباتا

ج) اکنه دارویی

د) اکنه مکانیکا

پرستاری که بیشتر در شب شیفت می دهد با توجه به اکنه خفیف کومدونال از شما در مورد درمان سوال می کند انتخاب دارویی شما چیست ؟

الف) کپسول ایزوترتینوئین

ب) محلول کلیندامایسین ۱٪

ج) ژل آداپالن

د) کرم ترتینوئین

کدام گزینه در ارتباط با بنزوئیل پروکسید غلط می باشد ؟

الف) نباید همزمان با ترتینوئین مصرف شود

ب) تا بحال مقاومت به آن گزارش نشده است

ج) خاصیت کومدولیتیک دارد

د) آنتی بیوتیک نیست ولی خاصیت باکتریواستاتیک دارد

کدام گزینه عارضه ایزوترتینوین نمی باشد ؟

الف) ترا توژنیسته

ب) هیپرکلسمی

ج) افزایش ICP

د) موتاژنیسته

در آقای ۲۵ ساله با اکنه کدام دارو جایگاهی ندارد؟

الف) قطره سولفاستامید ۱۰٪

ب) قرص اسپرینولاکتون

ج) قرص داپسون

د) کرم آزالتیک اسید



کدام گزینه افتراق دهنده اکنه و روزاسه می باشد ؟

الف) پاپول قرمز

ب) پاسچول

ج) کومدون

د) ندول

در بیماری ۴۲ ساله با اریتم و پاپول و پاسچول صورت و حملات  
فلاشینگ احتمال درگیری کدام عضو بیشتر می باشد ؟

الف) زخم دهانی

ب) ضایعه سیکاتریس سر

ج) درگیری گوش خارجی

د) درگیری چشمی

# بیماریهای مقاربتی

کدام گزینه در بیماری شانکروئید غلط می باشد ؟

الف) زخم کثیف و بی درد

ب) نمای school fish در نمونه لام میکروسکوپی

ج) درمان با سفتریاکسون ۲۵۰ میلی تک دوز

د) لنفادنوپاتی دردناک

علامت groove sign در کدام بیماری مقاربتی دیده می شود ؟

الف) شانکروئید

ب) سیفلیس

ج) لنفوگرانولوم ونروم

د) گرانولوم اینگوینال

در بیماری سیفلیس تمام گزینه ها درست هستند بجز ؟

الف) برای پیگیری درمان از تست VDRL استفاده می شود

ب) در سیفلیس ثانویه ۱ دوز پنی سیلین بنزاتین عضلانی کافی می باشد

ج) کوندیولاما اکومیناتوم در مرحله ۲ سیفلیس دیده می شود

د) در زن باردار مبتلا به سیفلیس که حساسیت به پنیسلین دارد باید با پنی سیلین درمان کرد

کدام بیماری مقاربتی لنفادنوپاتی نمی دهد؟

الف) شانکروئید

ب) سیفلیس

ج) گرانولوم اینگوینال

د) هرپس تناسلی

# جذام و سل



**کدام گزینه در ارتباط با واکنش های جذام غلط می باشد ؟**

الف) واکنش تیپ یک جذام تیپ ۴ افزایش حساسیت می باشد

ب) واکنش تیپ دو جذام تیپ ۳ افزایش حساسیت می باشد

ج) درمان انتخابی تیپ ۲ واکنش جذام تالیدوماید می باشد

د) واکنش تیپ ۱ جذام با علائم سیستمیک همراه می باشد

در بیماری جذام تمام گزینه ها صحیح هستند بجز ؟

الف) شیوع جذام در افراد HIV بالاتر نمی باشد

ب) جذام فقط در انسان دیده می شود

ج) جذام لپروماتوز سبب ریزش موی ابرو و اسکالپ می شود

د) حس دما اولین حس مختل شونده در جذام توبرکولید می باشد

در جذام توبرکولید TT کدام گزینه غلط می باشد ؟

الف) ضایعه پوستی دپیگمانته می باشد

ب) عصب مجاور ضایعه ضخیم می باشد

ج) ریزش مو و عدم تعریق در ضایعه دیده می شود

د) مدت درمان بیماری ۶ ماه می باشد

آقای با تشخیص جذام BT تحت درمان داپسون وریفامپین قرار گرفته  
و بعد درمان دچار التهاب ضایعات پوستی و نوریت دردناک می گردد  
کدام گزینه در این بیمار غلط می باشد ؟

الف) سریعا دارو را قطع کنید

ب) کورتن و ایندومتاسین در درمان آن بکار می رود

ج) این حالت واکنش تیپ ۱ جذام می باشد

د) این واکنش با علائم سیستمیک همراه نیست

آقایی با سل ریوی بدلیل ضایعات ندولر قرمز در گردن که فیستولیزه شده مراجعه نموده است تشخیص شما چیست ؟

الف) اسکروفولودرما

ب) لوپوس ولگاریس

ج) شانکر توبروکولوزیس

د) سل زگیلی

در فردی که تا بحال واکسن BCG نزده است و سیستم ایمنی فرد با باسیل سل برخورد نداشته است کدام ضایعه پوستی دیده می شود ؟

الف) سل زگیلی

ب) لوپوس ولگاریس

ج) اسکرفولودرما

د) شانکرسل

کدام گزینه سبب انتقال جذام می شود ؟

الف) ضایعه پوستی فرد جذامی LL

ب) ضایعه پوستی فرد جذامی BB

ج) ترشح بینی فرد BL

د) ترشح بینی فرد TT

آقای با یک ضایعه پلاک قرمز حاشیه برجسته با وسط دپیگمانته در  
ساعد که دچار ریزش مو و عدم تعریق شده به شما مراجعه نموده است  
کدام موارد با تشخیص جذام منافات دارد؟

الف) تک بودن ضایعه

ب) دپیگمانتاسیون

ج) ریزش مو

د) عدم تعریق



## کدام گزینه در جذام صحیح نمی باشد؟

- الف) جذام مادرزادی دیده نمی شود
- ب) برای پیش گیری جذام ایزوله کردن لازم نمی باشد
- ج) نروپاتی جذام پاسی با سیلر بشکل الگوی دستکش جوراب می باشد
- د) درمان جذام زن شیرده و حامله و کودکان فرقی با بقیه افراد ندارد

خانمی با پلاک قهوه ای و مرکز اسکار اتروفیک در صورت که در دیاسکوپي نمای Apple jelly دارد مراجعه نموده است با توجه به تست IGRA مثبت تشخیص شما چیست ؟

الف) جذام توبرکولید

ب) لوپوس پرنیوز

ج) لیژمن رسیدیونس

د) لوپوس ولگاریس



# اریتم مولتی فرم و استیون جانسون

در بیماری با تشخیص TEN کدام عامل در پروگنوز بیماری دخالت ندارد؟

الف) بی کربنات سرم

ب) میزان اوره خون

ج) سن

د) جنس

در بیماری که ۳ هفته پیش بدلیل تشنج تحت درمان کاربامازپین قرار گرفته از ۳ روز قبل دچار زخم پوستی و دهان و تناسلی و قرمزی چشم شده است کدام اقدام را انجام نمی دهیم؟

الف) شروع IVIG

ب) تجویز مورفین

ج) آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

د) سوند فولی

نوجوانی با ضایعات ماکولر و پاپولر و تارگت در آرنج و پشت و کف دست و زانو ها و پشت پا مراجعه نموده است کدام گزینه در این بیمار غلط می باشد ؟

الف) تب خال تناسلی از علل عود این بیماری می باشد

ب) تب خال لب از علل عود این بیماری می باشد

ج) در پاتولوژی این بیماری Interface dermatitis دیده می شود

د) ضایعه بعد ۳ هفته با گذاشتن اسکار خوب می شود

بیماری اریتم مولتی فرم یک واکنش ازدیاد حساسیت از چه تایپی

می باشد ؟

الف) تیپ ۱

ب) تیپ ۲

ج) تیپ ۳

د) تیپ ۴

کدام گروه از افراد زیر ریسک فاکتور سندرم TEN نمی باشد ؟

الف) دیابتی ها

ب) افراد HIV

ج) افراد slow acetylator

د) سابقه ضربه مغزی





ایدز

## در بیمار HIV کدام گزینه غلط می باشد ؟

- الف) شایعترین تظاهر پوستی این افراد درماتیت سبوره یک می باشد
- ب) شایعترین عفونت قارچی در این افراد کاندیداز می باشد
- ج) عامل لکوپلاکی موئی در این افراد ویروس EBV می باشد
- د) در این افراد BCC شایعتر از SCC می باشد

کدام گزینه زیر در یک بیمار نمی تواند مطرحگر HIV در بیمار باشد ؟

الف) فولیکولیت ائوزینوفیلیک

ب) زونا راجعه

ج) لکوپلاکی موئی

د) انیکومایکوز دیستال

در بیمار HIV کدام ضایعه خطر بدخیمی ندارد؟

الف) اکتنیک کراتوز

ب) لکوپلاکی

ج) لکوپلاکی مویی

د) اریتروپلاکی دهان